

Краткие сообщения

УДК 593.961.3

СИСТЕМАТИКА

***CUCUMARIA CONICOSPERMIUM SP. N.*  
(*DENDROCHIROTIDA, CUCUMARIIDAE*) – НОВЫЙ ВИД ГОЛОТУРИИ  
ИЗ ЯПОНСКОГО МОРЯ**

© 2002 г. В. С. Левин, В. Г. Степанов

Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии,  
Петропавловск-Камчатский 683000  
e-mail: leavin@mail.primorye.ru

Статья принята к печати 26.09.2001 г.

Приведено описание *Cucumaria conicospermium* sp. n. Новый вид отличается от других представителей рода формой спикул кожи тела и интроверта, а также морфологией спермиев.

**Ключевые слова:** *Cucumaria*, новый вид, Японское море.

*Cucumaria conicospermium* sp. n. (*Dendrochirotida, Cucumariidae*) – a new species of holothurian from the Sea of Japan. V. S. Levin, V. G. Stepanov (Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography, Petropavlovsk-Kamchatski 683000)

A new large-sized holothurian *Cucumaria conicospermium* from the Sea of Japan is described. The new species differs from other species of the genus *Cucumaria* by the shape of spicules of the body wall and the introvert and sperm morphology. (Biologiya Morya, Vladivostok, 2002, vol. 28, no. 1, pp. 66–69).

**Key-words:** *Cucumaria*, new species, Sea of Japan.

При обработке материалов, собранных экспедицией Института биологии моря в 1997 г. в районе м. Сосунова (Японское море), обнаружен новый для науки вид голотурии, описание которого приводится ниже.

*Cucumaria conicospermium* Levin et Stepanov, sp. n.  
(рис. 1–5).

**Материал.** Голотип – экземпляр длиной 9 см (инвентарный номер КНИРО-В-004), добыт 3 сентября 1997 г. в экспедиции на НИС "Академик Опарин", рейс № 20, станция 14, 46°24'08" с.ш., 138°19'08" в.д. (район м. Сосунова, Японское море), глубина 85 м, трал Сигбси, сборщик С.Н. Федоров. Паратип-1 – экземпляр длиной 10 см (инвентарный номер КНИРО-В-005), паратип-2 – экземпляр длиной 10 см (инвентарный номер КНИРО-В-006); добыты там же. Типовой материал хранится в КамчатНИРО.




Рис. 1. Глоточное кольцо (длина размерной линии 5 мм).

**Этимология.** Видовое название дано по строению сперматозоидов, отличающих этот вид кукумарий.

**Диагноз.** 10 шупалец равного размера. Преобладающий тип спикул кожи тела – суженные к одному концу и заканчивающиеся острым шипом (шипами) удлиненные перфорированные пластинки с отверстиями, равномерно распределенными по поверхности (1–3 отверстия в поперечном ряду); поверхность пластинок обильно покрыта бугорками, а их край снабжен острыми зубцами. В интроверте встречаются овальные и удлиненные пластинки со сглаженным краем, с множеством относительно мелких отверстий и с дугообразными перемычками, соединяющими бугорки, которые практически не встречаются у других видов кукумарий. Сперматозоиды имеют необычную для кукумарий особенность – коническую форму головки.

**Описание.** Тело огурцеобразной формы. Кожа тела довольно тонкая, жесткая. Окраска кожи (на фиксированном материале) темно-коричневая, шупалец – светло-коричневая. Амбулакральные ножки мелкие, втяжные, расположены преимущественно по радиусам в два ряда.

Шупалец 10, равного размера.

Диаметр ротового диска около 1.5 см. Мышцы-ретракторы довольно широкие (5–8 мм в расширенной части), длина на фиксированном материале 2.0–3.0 см, прикрепляются к стенке тела посередине длины тела. Продольные мышцы шириной 3–5 мм.

Каменистый канал один, сильно скрученный, длиной около 5 мм. Мадрепорит слегка удлиненный, уплощенный, 2–3 мм в диаметре.

У голотипа два полиевых сосуда, отходящих от дорсальной стороны кольцевого амбулакрального канала, длиной 1.2 и 3 см. У паратипов их по одному, длиной соответственно 2.5 и 2.8 см.

Известковое глоточное кольцо слабо кальцинировано (рис. 1). Радиальные пластинки высотой около 14 мм, имеют широкое основание с глубокой выемкой по заднему краю ■




Рис. 2. Спикаулы кожи тела (здесь и на рис. 3–5 длина размерной линии 100 мкм).




Рис. 3. Спикаулы интроверта.




Рис. 4. Спикаулы ротового диска.

плавное сужение к переднему. Интеррадиальные пластинки ланцетовидной формы длиной около 13–14 мм и шириной, примерно равной ширине радиальных.

Все исследованные особи – самки. Гонады развиты умеренно, их окраска на фиксированном материале оранжевая.

Спикаулы кожи тела (рис. 2) наиболее широко представлены суженными к одному концу и заканчивающимися острым шипом (шипами) удлиненными перфорированными пластинками с отверстиями, равномерно распределенными по поверхности (1–3 отверстия в поперечном ряду); поверхность пластинок обильно покрыта бугорками, а их край снабжен острыми зубцами. Кроме того встречаются лопастные пластинки с шиповатым краем и большим числом бугорков на поверхности, палочковидные спикаулы без отверстий и удлиненные, изогнутые и ракетковидные перфорированные пластинки, край которых, как правило, не несет острых шипов, и без бугорков на поверхности.

Спикаулы интроверта (рис. 3) можно разделить на три группы: 1) палочковидные спикаулы без отверстий; 2) удлиненные, лопастные и ракетковидные спикаулы с зубчатым краем и довольно крупными отверстиями; 3) овальные и удлиненные пластинки со слаженным краем, с множеством относительно мелких отверстий и дугообразными перемычками, соединяющими бугорки. У других известных кукумарий подобные пластинки встречаются в единичном количестве или же совсем не встречаются.

Спикаулы ротового диска (рис. 4) представлены удлиненными, изогнутыми и ракетковидными пластинками, как правило, с зубчатым краем и крупными отверстиями неправильной геометрической формы, а также разветвленными палочками без отверстий.

Спикаулы щупальца (рис. 5) более разнообразны по форме, чем других частей тела. Здесь встречаются прямые, дугообразные и крестообразные палочковидные спикаулы без отверстий, а также перфорированные пластинки различной

формы (лопастные, ракетковидные, изогнутые, округлые, удлиненные и т.д.). Край пластинок, как правило, более слаженный, бугорков на поверхности меньше или же они вовсе отсутствуют.

Сперматозоиды нового вида имеют необычную для кукумарий особенность – коническую форму головки.

Сравнение. Новый вид отличается от других представителей рода формой спикаул кожи тела и интроверта. Преобладающий тип спикаул кожи тела – суженные к одному концу и заканчивающиеся острым шипом (шипами) удлиненные перфорированные пластинки с отверстиями, равномерно распределенными по площади; поверхность пластинок обильно покрыта бугорками, а их край снабжен острыми зубцами. В интроверте встречаются овальные и удлиненные пластинки со слаженным краем, множеством относительно мелких отверстий и дугообразными перемычками, соединяющими бугорки. У других известных кукумарий подобные пластинки встречаются в единичном количестве или же совсем не встречаются.

Сперматозоиды у нового вида имеют совершенно необычное для кукумарий строение. Имея бочонкообразное ядро, они обладают конической головкой, что обусловлено наличием большой акросомы (Тюрин, 2001), тогда как большинство видов голотурий имеют сферическую или эллипсоидную форму сперматозоидов (Дроздов, Касьянов, 1983; Дроздов, Иванков, 2000). Особенности структуры сперматозоидов нового вида и их принципиальные отличия от сперматозоидов *C. japonica* подробно рассмотрены сотрудниками Дальневосточного государственного университета и Института биологии моря ДВО РАН (Тюрин, Дроздов, 2001).

Кроме того, новый вид отличается от *C. japonica* и *C. frondosa* окраской женской гонады: у него она оранжевая, у *C. japonica* – тускло-зеленая, а у *C. frondosa* – бордово-коричневая (Левин, Гудимова, 1997).




Рис. 5. Спикалы щупалец.

От *C. frondosa*, *C. japonica*, *C. koraensis*, *C. miniata*, *C. echinata* и *C. lefevrei* новый вид отличается также составом тритерпеновых гликозидов (Авилов, 2000; новый вид рассмотрен как *Cucumaria* sp.).

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Авилов С.А. Тriterpenовые гликозиды голотурий отряда Dendrochirotida: Автореф. дис. ... д-ра хим. наук. Владивосток: ТИБОХ ДВО РАН. 2000. 62 с.

Дроздов А.Л., Иванков В.Н. Морфология гамет животных. Значение для систематики и филогенетики. М.: Круглый год. 2000. 460 с.

Дроздов А.Л., Касьянов В.Л. Размеры и форма гамет у морских двустворчатых моллюсков // Биол. моря. 1985. № 4. С. 33–40.

Левин В.С., Гудимова Е.Н. О таксономических отношениях голотурий *Cucumaria frondosa* и *Cucumaria japonica* (Dendrochirotida, Cucumariidae) // Зоол. журн. 1997. Т. 76, № 5. С. 575–584.

Тюрин С.А. Новый вид голотурий рода *Cucumaria* (Holothuroidea, Echinodermata) залива Петра Великого Японского моря // Региональная конференция по актуальным проблемам морской биологии и экологии студентов, аспирантов и молодых ученых. Владивосток: ДВГУ. 2000. С. 133–134.

Тюрин С.А., Дроздов А.Л. Ультраструктура сперматозоидов двух видов голотурий рода *Cucumaria*, (Dendrochirotida, Holothuroidea) Японского моря // Биол. моря. 2002. Т. 28, № 1. С. 70–73.