

«БАЙДАРКА»

Уже около столетия известно, что в ряде прибрежных озер Командорских островов обитает своеобразный лосось, называемый местным населением «байдаркой», красноватый оттенок на боках половозрелых особей которого напоминает малиновую полосу вдоль тела у микижи. Вероятно, это и ввело в заблуждение известного российского ихтиолога Е.К.Суворова, который, проводя в начале прошлого века исследования на о. Беринга, ошибочно принял «байдарку» за микижу, включив ее в состав ихтиофауны озера Саранное. Долгое время более точного определения этой диковинной рыбы так и не было сделано. И лишь в 70-е годы прошлого века удалось окончательно установить, что «байдарка» является ни чем иным, как пресноводной или жилой формой кижуча.



До второй половины 30-х годов считалось, что на Камчатке лишь один вид лососей – нерка, может образовывать пресноводную форму, особи которой не уходят на нагул в море (наиболее многочисленное стадо жилой нерки или как ее еще называют «кокани»

обитает в Кроноцком озере). Но в 1938 г. отечественным ихтиологом П.А.Двининым в оз. Малое Саранное, расположенном на восточном побережье Камчатки недалеко от Петропавловска-Камчатского, впервые была обнаружена жилая форма другого вида лососей – кижуча. Некоторое время считалось, что это единственный в мире водоем, где обитает жилой кижуч, поскольку больше нигде его пресноводной формы не встречали. Однако в дальнейшем жилой кижуч был найден еще в двух озерах (Котельное и Халактырское) вблизи Петропавловска-Камчатского, а также выяснено, что обитающая в таких прибрежных озерах о. Беринга как Саранное, Гаванское, Ладыгинское, Шангинское и Китовое «байдарка» является пресноводной формой этого вида лососей. После чего специалисты-ихтиологи высказали предположение, что жилой кижуч может быть обнаружен и в ряде других

реликтовых озер Камчатки (а их на побережьях полуострова немало), отшнуровавшихся когда-то от моря. Наглядным подтверждением этого предположения стала находка в 2004 г. пресноводной формы кижуча в небольшом оз. Голыгинское, расположенном в верховьях р. Кузанек, правом притоке реки Голыгина.

Биология «байдарки» до настоящего времени остается изученной довольно слабо. Эта форма кижуча отличается от проходной значительно меньшими размерами и довольно специфичным брачным нарядом. Максимальная длина «байдарки» достигает 53 см, а масса тела - 2,1 кг, но чаще всего попадаются ее особи размером 20-35 см и 150-300 г. Общий фон окраски половозрелых рыб оливковый или темно-зеленый, на боках у них красноватый оттенок, спина же и хвостовой плавник покрыты многочисленными темными пятнами. Созревает «байдарка» на втором-пятом годах жизни. Преобладающее большинство ее особей – самцы, хотя редко встречаются самки, выметывающие до 600-2000 крупных икринок, которые всё же несколько мельче и бледнее икры проходной формы кижуча. Питается «байдарка», главным образом, различными донными организмами (личинками насекомых, ракообразными, моллюсками) и воздушными насекомыми. Но самые старшие особи переходят на хищный образ жизни, потребляя молодь нерки и мелких рыб (в основном колюшек и корюшек), в связи с чем, у них отмечается резкое увеличение темпа роста, а, следовательно, и размеров.

По сообщению жителей острова Беринга, скопления «байдарки» ежегодно отмечаются с сентября до начала января как в оз. Саранное у истока одноименной реки, так и в ней самой. Нерестится «байдарка» на тех же нерестилищах, что и проходной кижуч. Зимой она приобретает серебристую окраску и прогонистую форму тела, мигрирует по всему озеру, не образуя нигде больших концентраций, а потому в уловах рыболовов-любителей (ведя хищный образ жизни, «байдарка» хорошо ловится на блесну и мормышку), чаще всего, встречается единично. В других озерах острова Беринга (Китовом, Шангинском, Ладыгинском и Гаванском) «байдарка» очень немногочисленна, в связи с чем, попадает довольно редко.

Учитывая уникальность и невысокую численность «байдарки» в прибрежных озерах Командорских островов, ученые предлагают включить ее (а также все другие известные на сегодняшний день на Камчатке популяции жилого кижуча) в «Красную книгу Камчатки», повсеместно ограничив вылов этой своеобразной рыбы.